



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
Pró-Reitoria de Saúde

NOTA TÉCNICA PR-5 nº 09/2022

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – COOVIGS – PR5

**PROTOSCOLOS DE BIOSSEGURANÇA NA UERJ RELACIONADOS À  
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA INTERNACIONAL  
DA NOVA VARÍOLA “MONKEYPOX” (09/11/2022)**

A *Monkeypox* (MPX), nova varíola ou “varíola dos macacos” é uma doença zoonótica viral conhecida desde 1958, cuja transmissão pode ocorrer por meio do contato direto com um animal silvestre, humano ou material/ utensílio infectados. Diferente da varíola humana, ela apresenta baixa taxa de mortalidade (0,022%) nos países não-endêmicos, como o Brasil. Os sinais e sintomas envolvem febre, erupções ou lesões na pele, linfonodos aumentados (ínguas), calafrios, fraqueza, dores no corpo e de cabeça e podem persistir de duas a quatro semanas, sendo o período médio de incubação de uma a duas semanas.

O painel *Monkeypox*, da Secretaria Estadual de Saúde do RJ, apresenta os dados epidemiológicos relativos aos casos da nova varíola, assim como seus critérios de definição, notificações e fluxo para agendamentos de testagem. Atualmente, são 4525 casos notificados no estado, sendo 1253 confirmados, 356 em investigação, 145 prováveis, 2764 descartados, e 5 óbitos.

## **1. DEFINIÇÃO DE GRUPOS E/OU CASOS:**

**1.1 Grupos de maior vulnerabilidade:** pessoas imunossuprimidas, gestantes e crianças.

**1.2 Casos confirmados:** caso suspeito com resultado laboratorial "Positivo/Detectável" para *Monkeypox* vírus (MPXV) por diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou Sequenciamento).

**1.3 Casos suspeitos / em investigação:** Indivíduos que apresentem repentinamente lesões em mucosas e/ou erupções cutâneas agudas, únicas ou múltiplas, sugestivas de *Monkeypox* em qualquer parte do corpo, podendo estar associadas a sinais e sintomas como: febre de início súbito, adenomegalias (nódulos linfáticos aumentados), cefaleia, dor muscular, astenia/fraqueza, dor de garganta, suor/calafrios, dor nas costas, entre outros.

**1.4 Caso provável/contactantes:** Enquadrado como caso suspeito, apresentando um ou mais dos sinais ou sintomas acima. Investigação laboratorial de *Monkeypox* não realizada ou inconclusiva.

**1.5 Casos Descartados:** caso suspeito com resultado laboratorial "Negativo/Não Detectável" para Monkeypox vírus (MPXV) por diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou sequenciamento).

## **2. ISOLAMENTO (para casos confirmados e prováveis/contactantes):**

Casos confirmados de *Monkeypox*, em investigação ou casos prováveis/contactantes que não necessitem de hospitalização deverão permanecer em isolamento domiciliar por até 21 dias após do início de sintomas. No caso descartado, o isolamento domiciliar deverá ser suspenso.

## **3. LOCAL DE ATENDIMENTO PARA A COMUNIDADE DA UERJ**

Policlínica Universitária Piquet Carneiro – PPC/UERJ

Av. Marechal Rondon, 381 - São Francisco Xavier - Rio de Janeiro/ RJ - 20950-003

Segundas, quartas e quintas, das 13h às 15h30.

Tel. (21) 2566-7000

[contato.ppc@uerj.br](mailto:contato.ppc@uerj.br)